

# Première récolte de *Lytorhynchus maynardi* (Alcock et Finn, 1896) en Iran (Serpentes, Colubridae)

par Mohammad BALOUTCU \*

**Résumé.** — *Lytorhynchus maynardi*, espèce connue jusqu'ici seulement du Pakistan, a été récemment récoltée en Iran.

**Abstract.** — *Lytorhynchus maynardi*, known only in Pakistan, was recolted in S. W. Iran.

Ayant fait de nombreux voyages au Lout (sud-ouest de l'Iran), je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion de capturer *Lytorhynchus maynardi* ; c'est la première récolte de ce Colubridae en Iran. Cette espèce vit généralement dans la partie occidentale du Pakistan.

## DESCRIPTION

La tête est longue et il est difficile de la distinguer du cou. La rostrale a une forme triangulaire, assez pointue. Elle s'insère en coin, postérieurement entre les écailles internasales. Les écailles préfrontales, moins grandes que les internasales, dépassent l'aplomb de la lèvre inférieure. La largeur des écailles frontales est plus grande que leur longueur. Les narines s'ouvrent entre deux écailles. L'œil est entouré par sept écailles : deux préoculaires, deux postoculaires, deux sousoculaires qui séparent l'œil de la lèvre supérieure et, enfin, une supraoculaire. Il y a deux temporales antérieures et trois temporales postérieures. On voit aussi sept supralabiales et onze labiales inférieures.

Le nombre d'écailles autour du corps, presque cylindrique, varie : dans la région du cou, on compte 20 écailles, tandis que postérieurement, elles sont au nombre de 19 et enfin de 15 dans la région anale. Longitudinalement, les rangées d'écailles sont au nombre de 195 (ventrales) et de 56 (caudales).

La longueur totale de l'animal atteint 272 mm dont 42 mm pour la queue.

**Coloration :** Le dos est beige jaunâtre avec trois séries de taches noires plus ou moins foncées. La première série est médiane, les taches sont ovales et très foncées. Les taches de la deuxième série, placées de chaque côté de la première, sont plus petites et aussi plus pâles. Celles de la troisième série sont encore plus pâles et parsemées, sans ordre défini, plus latéralement. Le ventre est blanc jaunâtre.

\* Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université de Téhéran, Iran.



FIG. 1. — Répartition géographique de *Lytorhynchus maynardi*.

#### HABITAT

*Lytorhynchus maynardi* a été trouvé dans le désert sableux de Lout, région de Zangui Ahmad et Chahroch-Abad. La végétation y est rare, formée de quelques buissons xérophytes d'*Artemisia*, surtout *A. maritima*, *A. turanica* et *A. terrae albae*. Au printemps, pendant une courte durée, parmi ces buissons, fleurissent un certain nombre de plantes profitant du climat plus élément. Pendant mon séjour la température ne dépassait pas 32°C, tandis qu'en été elle atteint 55°C.

Nous avons capturé ce spécimen le 5 mars 1973, dans la nuit. Il était très actif ; ayant peur de la lumière, il a attaqué les pinces du récolteur sans ouvrir la bouche. En captivité il ne voulut pas se nourrir et mourut après 21 jours.

#### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- LEVITON, A. E., et S. C. ANDERSON, 1970. — Review of the Snakes of the genus *Lytorhynchus*. *Proc. Calif. Acad. Sci.*, (4), 37 : 249-274, 15 fig.
- MINTON, S. A., 1966. — A contribution to the Herpetology of West Pakistan. *Bull. Am. Mus. nat. Hist.*, 134 : 27-184, 12 fig., 7 tabl., 27 pl., 5 cart.

Manuscrit déposé le 24 mars 1976.

*Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris*, 3<sup>e</sup> sér., n° 417, nov.-déc. 1976,  
Zoologie 294 : 1377-1378.

Achevé d'imprimer le 28 février 1977.